



Grandes Cultures

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

AUVERGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°27 du 5 septembre 2002 - 1 page

Colza : Attention aux limaces et aux altises.

Maïs : un nouveau ravageur Diabotrica virgifera

MAÏS

Stade : grain pâteux.

Pyräle

Les symptômes de casse de tige sont maintenant facilement observés dans les parcelles. La période de forte activité de ponte s'est située cette année du 25 juin au 25 juillet. Il est assez rare de voir une période d'activité aussi étalée. Les traitements positionnés début juillet ont du couvrir la majorité des éclosions de larves.

Si vous avez laissé une zone témoin non traitée ou constaté des dégâts malgré un traitement bien positionné, vous pouvez nous contacter pour que l'on effectue un comptage larvaire.

Philippe Ceyssat : Tel 04 73 42 14 83

Diabotrica virgifera

Ce petit coléoptère de 7 mm de long dont les larves se nourrissent des racines du maïs est le principal ravageur du maïs aux Etats Unis.

Après avoir été découvert pour la première fois en Europe (Serbie) en 1992, la chrysomèle des racines du maïs a rapidement envahi les pays voisins. En 2000 et 2001, deux foyers ont été découverts en Suisse et en Italie.

Pour la deuxième année, une surveillance à base de piège à phéromone est en place sur l'ensemble du territoire et en région Auvergne.

Cet été, des captures ont été réalisées à proximité des aéroports du Roissy et du Bourget. Un plan de lutte obligatoire a immédiatement été mis en place pour éradiquer rapidement les foyers.

COLZA

Stade : Semis à deux feuilles.

Cuvettes jaunes

Dès le semis effectué, penser à remettre les cuvettes dans vos parcelles.

Jusqu'au stade 2 à 4 feuilles, la cuvette doit être légèrement enterrée pour piéger correctement les altises.

Limaces

Les conditions humides que l'on connaît depuis maintenant deux semaines doivent vous inciter à la vigilance.

Surveillez régulièrement vos parcelles.

Altises

Petites ou grosses, les altises sont généralement les premiers insectes en action dès le stade cotylédons.

L'année dernière, de fortes attaques de petites altises s'étaient produites dans des parcelles bordant d'anciens champs de colza avec repousse.

Les attaques importantes de grosses altises sont relativement rares depuis quelques années. La cuvette jaune vous permet de détecter l'arrivée de l'insecte. Ensuite un rapide comptage des morsures circulaires dans les cotylédons et les jeunes feuilles vous situe par rapport au seuil d'intervention de 3 pieds sur 10 avec morsures.

Service Régional de
la Protection des
Végétaux
Site de Marmilhat BP 45
63370 LEMPDES
Tél. 04.73.42.14.83
Fax 04.73.42.16.76
www.srpv-auvergne.com

Imprimé à la Station
d'Avertissements
Agricoles de la DRAF
AUVERGNE

Le Directeur gérant :
D. DIDELOT

Publication périodique
C.P.P.A.P n°2315AD
ISSN n°1254.6372

Tarifs : Courrier : 55 €
Fax : 50 €
Internet : 45 €